



Ketamina 50

KETAMINA BASE 50 mg/ml



Anestésico disociativo inyectable.

Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.



Ketamina 50

Anestésico disociativo inyectable.

Produce anestesia por disociación y analgesia. Es muy versátil ya que se puede combinar con la mayoría de los fármacos utilizados, en las distintas etapas de la anestesia general.

Acción:

Actúa deprimiendo la función tálamo-corteza y estimulando la zona límbica produciendo:

- Analgesia somática
- Hipertonía muscular
- Estado cataléptico
- Conserva presentes los reflejos: corneal, faríngeo, laríngeo y deglutorio.

Indicaciones:

Principales indicaciones de su utilización:

- Anestésico de elección para operación cesárea.
- Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.
- Se puede combinar con otras drogas para bloquear los efectos colaterales indeseables y obtener un mejor protocolo anestésico.
- Es muy útil en la anestesia de pacientes hemodinámicamente inestables.

Farmacocinética:

Se puede administrar por todas las vías: SC, IM, EV. También podría suministrarse por vía oral.

Tiene una amplia y rápida distribución plasmática unida a proteínas.

La latencia por vía EV es corta, no más de 60 segundos, por vía IM puede ser de 5-10 minutos.

El metabolismo es hepático y la excreción es renal.

KETAMINA BASE 50 mg/ml

Solución inyectable - Vía EV, IM
Para Perros y Gatos

Administración y Dosis:

Perros y Gatos:	EV: 7 a 10 mg/Kg.
	IM: 15 a 25 mg/Kg.

La administración vía endovenosa debe hacerse lentamente.

Amplio margen de seguridad.

Combinable con la mayoría de los anestésicos, fenotiacinas, benzodiazepinas, alfa 2 agonistas, propofol, barbitúricos, agentes inhalantes, opioides, etc.

La combinación con otras drogas anestésicas puede reducir hasta un 50% la dosis de Ketamina.



Fórmula:

Cada ml de solución inyectable estéril contiene:
Ketamina base (como clorhidrato) 50 mg
Vehículo csp 1 ml

Presentación: Frasco ampolla por 50 ml.